

BIJSLUITER AZITROMYCINE TEVA TABLET - 500 MG

Azitromycine is een antibioticum. In elke tablet zit 500 mg azitromycine.

Dit is een verkorte uitleg voor gebruik van medicatie, voorgeschreven door Stimezo Zwolle. Voor de volledige bijsluiter zie: <https://db.cbg-meb.nl/bijsluiters/h28934.pdf>
Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof **azitromycine**.

WERKING EN/OF TOEPASSING:

Om infecties na een abortus te voorkomen of om een aanwezige besmetting met chlamydia, van de urethra (urinebuis) en de baarmoederhals, te behandelen. Het medicijn remt de groei van verschillende soorten bacteriën.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Ter voorkoming en behandeling van (chlamydia) infecties: eenmalig 2 tabletten in een keer innemen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Niet gebruiken bij:

- een allergie voor sommige antibiotica (macroliden)

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

Let op:

- bij lever-, nier- en hartproblemen
- bij sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming (bijvoorbeeld Myasthenia Gravis)
- Gebruik altijd in overleg met de arts!

Bijwerkingen:

Overgevoeligheidsreactie. Merkt u een of meer van de volgende klachten:

- moeilijkheden met ademen, praten en slikken
- zwelling van de lippen, tong, gezicht en nek
- extreme duizeligheid
- ernstige of jeukende huiduitslag

Waarschuw dan meteen een arts of ga zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Of bij:

- ernstige diarree met koorts
 - ontsteking van de lever.
 - ontsteking van de alvleesklier, wat ernstige pijn veroorzaakt in de buik en de rug
 - verhoogde of verminderde urine uitscheiding
 - huiduitslag met overgevoeligheid voor zonlicht
 - ongewone blauwe plekken
 - onregelmatige hartslag
- Neem dan direct contact op met uw arts.

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen, maar hoeven niet bij u voor te komen:

- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, buikpijn, sterke winderigheid en diarree
- minder zin in eten, andere smaak
- hoofdpijn, duizelig voelen, moe zijn
- huiduitslag, jeuk, doof, tintelend of prikkelend gevoel
- minder goed kunnen zien of horen
- pijn in de gewrichten

GEBRUIK IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:

Gebruik met andere geneesmiddelen:

Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:

- een hartmiddel (digoxine)
- sommige middelen tegen migraine (ergotamine, dihydroergotamine en methysergide)

Gelijktijdig gebruik kan ernstige afwijkingen in het hartritme veroorzaken:

- sommige middelen bij een afwijkend hartritme
- een middel bij hoge bloeddruk (ketanserine)
- sommige middelen bij misselijk zijn, overgeven (domperidon, ondansetron, chloorpromazine)
- sommige middelen bij depressie (citalopram en escitalopram)
- een middel bij pijn en verslaving aan drugs (methadon)

Gebruik bij borstvoeding:

Geeft u borstvoeding? Dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het geven van borstvoeding moet daarom onderbroken worden tot 2 dagen na behandeling met dit geneesmiddel.

Overleg voor inname eerst met de verpleegkundige of de arts.

Gebruik samen met andere, niet hierboven genoemde medicijnen: Overleg altijd eerst met de verpleegkundige of de arts.

Disclaimer:

De inhoud van deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie in deze folder op een bepaald moment actueel juist, volledig of van toepassing is. De inhoud van deze folder is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.